

CIDENTAL

LARVICIDA Y REPELENTE

FICHA
TÉCNICA



INDICACIONES

CIDENTAL está indicado en bovinos para el tratamiento de heridas inclusive del ombligo de los terneros recién nacidos. Como larvicida y repelente de moscas en general: *Musca domestica* y *Cochliomyia hominivorax*. En la cura y prevención de miasis (gusaneras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*.

CIDENTAL es muy eficaz para el tratamiento profiláctico de las heridas quirúrgicas, castración y descornado principalmente. Está indicado para el tratamiento de las miasis en heridas.



BENEFICIOS

- **Efecto desalojante único:** las larvas salen de la herida antes de morir.
- **Acción larvicida.**
- **Repelente de moscas:** Previene nuevas miasis.
- **Las larvas y heridas libres de moscas sanan más rápido.**
- **No lesiona el ombligo ni las heridas.**
- **No hace ruido, por lo que no asusta al animal.**
- **Práctico y fácil de aplicar.**
- **El color violeta permite identificar los animales tratados.**

Ver el reverso para información completa de administración y dosis

CIDENTAL

LARVICIDA Y REPELENTE



INTRODUCCIÓN

CIDENTAL actúa como desalojante de las larvas, larvicida, repelente y cicatrizante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CIDENTAL, matabichera a base de:

Propoxur: carbamato que actúa como un inhibidor de la colinesterasa que lleva a las larvas a la hiperactividad (lo que facilita su salida de la herida), seguida de ataxia, convulsiones, parálisis y muerte. Es por esto que **CIDENTAL** actúa rápidamente y tiene un gran efecto de derribo (hace que la larva caiga rápidamente).

Cihalotrina: piretroide que actúa sobre los canales de sodio de las células del sistema nervioso de los insectos (incluidas las larvas), causando la despolarización de la membrana nerviosa. También actúa sobre los receptores de GABA y glutamato. El resultado final de su acción es la hiperactividad, seguida de la incoordinación de los movimientos, temblores, convulsiones, caídas y muerte del ectoparásito. La cihalotrina permite que **CIDENTAL** tenga una larga acción y un efecto duradero.

Juntos, propoxur y cihalotrina tienen acción complementaria, haciendo que las larvas salgan rápidamente de la herida y mueran, además de actuar durante más tiempo en el sitio de aplicación.

FÓRMULA

Cada 100 mL contienen:

Cihalotrina	1,00 g
Propoxur	1,00 g
Excipientes	100.00 mL

INDICACIONES

CIDENTAL está indicado en bovinos para el tratamiento de heridas inclusive del ombligo de los terneros recién nacidos. Como larvicida y repelente de moscas en general: *Musca domestica* y *Cochliomyia hominivorax*. En la cura y prevención de miasis (bicheras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*.

CIDENTAL es eficaz para el tratamiento profiláctico de las heridas quirúrgicas, castración y descornado principalmente. Está indicado para el tratamiento de gusaneras.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

CIDENTAL está indicado exclusivamente para uso tópico. Limpiar, lavar y secar la herida. Aplicar abundantemente el producto en el lugar de la herida o en la "bichera" y a su alrededor. Normalmente una aplicación es suficiente. Si es necesario, repetir con intervalo de 24 horas.

En el caso de bicheras cuya abertura está orientada hacia abajo, aplicar el producto y mantener al animal acostado durante al menos 3 minutos para que el producto alcance las capas inferiores.

PRECAUCIONES

CIDENTAL como todo insecticida, debe ser manipulado cuidadosamente.

- No almacenar el producto con alimentos, medicamentos, bebidas y productos de higiene personal o del hogar.
- No almacenar en casas de habitación.
- Lavarse bien las manos y la parte expuesta del cuerpo antes de comer o beber y después de trabajar con el producto.
- Utilizar equipo de protección individual (guantes, máscara, lentes de protección, gorro y máscara contra gases tóxicos) en el momento de la aplicación del producto.
- No reutilizar los envases vacíos.
- Destruya el envase después del uso del producto.
- No contaminar ríos y otros tipos de agua.
- Su aplicación no puede superar el 20% de la superficie corporal del animal tratado.
- En caso de contacto accidental en humanos buscar atención médica inmediatamente.
- El antídoto en caso de intoxicación, incluye Sulfato de Atropina (Propoxur) y el tratamiento sintomático de los piretroides (Cihalotrina).

No apto para uso en humanos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte a su Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C. Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Frascos de 250 mL.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com

www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
BOLIVIA	SENASAG PUV.F no. 006478/15
ECUADOR	3B-15147-AGROCALIDAD
PERU	F.74.371.0061
PARAGUAY	SENACSA N°16.938

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com