

EPRIFORT 1%

Eprinomectina 1%

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Para el tratamiento y control de las infestaciones de los bovinos causadas por nemátodos gastrointestinales en la forma adulta (*Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* y *Trichuris discolor*), larvas de *Dermatobia hominis* (miasis o gusaneras) y mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Eprifort 1% puede ser administrado con seguridad en bovinos jóvenes y adultos, incluso en hembras preñadas o vacas en lactación.

BENEFICIOS

- Endectocida sin tiempo de retiro en leche y en carne.
- Controla Endoparásitos y Ectoparásitos.
- Aplicación pour on, lo que significa fácil aplicación, menos estrés en los animales y mayor ganancia de peso diario.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

EPRIFORT 1%

Eprinomectina 1%



INTRODUCCIÓN

Eprifort es un endectocida de aplicación pour on, a base de Eprinomectina al 1%.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Eprinomectina es producida por la fermentación del *Streptomyces avermitilis*. Es un endectocida perteneciente al grupo de las lactonas macrocíclicas. Los compuestos de esta clase se unen selectivamente y con una alta afinidad a los canales de ion cloruro regulados por el glutamato que se encuentran en los nervios y las células musculares de los invertebrados. Ello conduce a un incremento de la permeabilidad de la membrana celular a los iones cloruro con hiperpolarización de la célula nerviosa y muscular, que da como resultado la parálisis y muerte del parásito.

FÓRMULA

Cada 100 mL de Eprifort 1% contienen:

Eprinomectina	1,00 g
Excipientes c.s.p.	100,00 mL

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de las infestaciones de los bovinos causadas por nemátodos gastrointestinales en la forma adulta (*Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* y *Trichuris discolor*), larvas de *Dermatobia hominis* (miasis, nuca) y mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Eprifort 1% puede ser administrado con seguridad en bovinos jóvenes y adultos, incluso en hembras preñadas o vacas en lactación.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Presionar el frasco para que el producto pase al dosificador, en la cantidad correcta para el peso de cada animal. Aplicar el producto desde la cruz hasta la inserción de la cola.

Bovinos: Administrar 1 mL para cada 20 kg de peso, equivalente a 500 µg por kilogramo de peso.

TIEMPO DE RETIRO

Leche: Cero días
Carne: Cero días

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Producto indicado exclusivamente para uso tópico en bovinos. No administrar en días con lluvia ni en animales mojados. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No aplicar en áreas del dorso con barro o estiércol. Evitar el contacto con la piel y las mucosas de quien aplique el producto. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua corriente.

No utilice el envase vacío para otros fines. Utilizar equipo de protección personal individual para manipular el producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C. Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Frasco de 1 L

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com
www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
BOLIVIA	SENASAG PUV.F no. 009852/21
ECUADOR	RIP-FAR-419
PARAGUAY	Reg.SENACSA N°20.931

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com